




Lactarius tabidus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 346. 1838

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* de tamaño pequeño o medio. *Píleo* de 20-55 mm de diámetro, convexo, después aplanado y deprimido en el centro, a menudo con un pequeño umbón; margen primero incurvado, pronto recto y regular, finamente estriado; superficie pileica mate, lisa, en la madurez finamente venosa, seca, de color ocre-amarillo, naranja-ladrillo o ocre-naranja. *Láminas* apretadas, estrechas, de adnatas a decurrentes, con numerosas lamélulas, crema o crema salmón, finalmente con tonos rosados; arista entera y concolor. *Estípite* de 30-80 × 4-12 mm, cilíndrico o claviforme, liso, seco, hueco en la madurez, beige-rosado, ocráceo-naranja, naranja-ladrillo oscuro hacia la base, más pálido en la parte superior. *Contexto* frágil, de crema a crema-rosado, más oscuro en la base del estípite, amarillento en algunos minutos, sabor un poco astringente, olor débil y dulzón como a insectos; látex abundante, blanco, amarillo-pálido en varios minutos, sabor suave y después astringente o débilmente acre.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (6,2-) 7,3 ± 0,72 (-8,5) × (5,4-) 6,1 ± 0,42 (-7,1) µm / Q = (1,10-) 1,25 ± 0,10 (-1,40); de subglobosas a elipsoides, con ornamentación de cretas hasta ×1,5 µm de proyección, de redondeadas a agudas, poco ramificadas, apenas con finos conectivos que forman un retículo incompleto. Esporada blanquecina. *Basidios* de 30-55 × 7-11 µm, tetráspóricos, claviformes. *Queilomacrocidios* de 25-60 × 5-10 µm, abundantes, fusiformes o con el ápice agudo o adelgazado. *Pileipellis* de estructura celulosa, con elementos terminales de 10-40 × 3-7 µm, cilíndricos o con el ápice adelgazado, elementos de la subcutis hinchado, subglobosos, irregulares, de hasta ×25 µm.

Ecología. En verano y principios de otoño en bosques de frondosas (*Betula*, *Quercus*, *Corylus*) más raramente coníferas (*Picea*). Distribución. Poco frecuente, R. Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, 320 m, con *Quercus robur* y *Corylus avellana*, en zona muy húmeda próxima a un arroyo, 06-X-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016100616, Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Lactarius tabidus Fr., BAR2016100616, a. Basidiosporas, b. Paracistidios. Escala barra = 10 µm.

