



≡ *Agaricus serrulatus* Fr., *Observationes Mycologicae* 2: 216. 1818 [basónimo]
Leptonia serrulata (Fr.) P. Kumm., *Der Führer in die Pilzkunde*: 96. 1871
Rhodophyllus serrulatus (Fr.) Qué., *Enchiridion Fungorum in Europa media et*
praesertim in Gallia Vigentium: 60. 1886

Caracteres microscópicos. *Basidiósporas* de $(9,4-10,7 \pm 0,82 (-12,2) \times (5,8-7,0 \pm 0,40 (-7,1) \mu\text{m}$; $Q = (1,3-1,5 \pm 0,14 (-1,8)$, heterodiamétricas, multiangulosas, con 5-7 ángulos. *Queilocistidios* (arista estéril), de 40-100 $\times$ 10-20 μm , de cilindros a claviformes, con intenso pigmento azul violáceo oscuro en agua. *Pileipellis* formada por una trichoderma de hifas entremezcladas, gelificadas, artículos terminales hinchados o abultados, de calibre $\times 15-35 \mu\text{m}$, pigmentación intracelular azul violáceo oscuro, juntas sin fíbulas.

Figure 1 consists of two panels, (a) and (b), showing microscopic views of cells. Panel (a) displays a large number of small, pear-shaped cells, each with a prominent central nucleus and a flagellum extending from one end. Panel (b) shows a single, elongated, pear-shaped cell with a central nucleus and a flagellum, similar in morphology to the cells in panel (a).

Citar como: MUÑOZ, J. A. (2026). *Entoloma serrulatum* (Fr.) Hesler, micológica-barakaldo.org [en línea]. Fichas Micológicas, 1004 (Actualizada el 06-II-2026). ISSN 2660-633X. [consultado el xx/xx/xxx] <https://micologica-barakaldo.org/Entoloma-serrulatum/>



Queda prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión de la misma por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de la Sociedad Micológica Barakaldo. Las fotografías son propiedad de sus autores.