



Hydnum repandum L., Sp. Pl. 2: 1178. 1753

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* con píleo y estípite, medianos o grandes, aislados o agrupados. *Píleo* de 30- 120 mm de diámetro, al principio convexo, pronto extendidos e incluso algo deprimidos; margen largo tiempo involuto, liso, lobulado o sinuoso-crenulado; superficie finamente aterciopelada, no zonada, de color crema, albaricque, ocre-amarillo, ocráceo. *Himenóforo* situado en la cara inferior del basidioma, formado por acúleos o espinas cónicas, agudas, de hasta 6 mm, adnatos o un poco decurrentes, frágiles, blanquecinos, crema-ocráceo. *Estípite* de 20-60 × 15-30 mm, central o excéntrico, cilíndrico a veces sinuoso, frágil, ligeramente ensanchado hacia la base, blanquecino, manchándose de pardo-anaranjado en las heridas o rozaduras. *Contexto* frágil y quebradizo, blanquecino que algunos minutos toma un color pardo-anaranjado; olor débil afrutado, sabor primero dulce, amarescente o picante después.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (6,5-) 7,8 ± 0,65 (-9,0) × (5,5-) 6,1 ± 0,43 (-7,0) µm, Q = (1,1-) 1,3 ± 0,10; anchamente elípticas, hialinas, lisas, con pared fina, no amiloides. Esporada blanquecina. *Basidios* de 35-50 × 7-9 µm, claviformes, con 4-5 basidiosporas, juntas con fíbulas. *Sistema de hifas* monomítico, hifas generativas del contexto de hasta ×15 µm de anchura, parcialmente abultadas en los extremos, cilíndricas, con pared delgada, hialinas o amarillentas, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y de coníferas. Distribución. Muy común, CC. Material estudiado. ARABA, Murua, 640 m, con *Quercus robur*, 11-VII-2014, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2014071106. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Hydnum repandum L., basidiomas con coloración del píleo albaricque u ocre-anaranjado, típico de los hayedos de la cornisa cantábrica en verano.

