




Cortinarius delibutus Fr., Epicr. Syst. Mycol., 276. 1838 [1836-1838]

Caracteres macroscópicos. *Píleo* de hasta 90 mm de diámetro, primero globoso, después convexo campanulado, finalmente extendido; margen regular, un poco sinuoso, incurvado; superficie pileica separable, muy viscosa, amarescente, brillante, tenaz, de color amarillo dorado, amarillo pálido. *Láminas* poco apretadas, desiguales, con numerosas lamélulas, anchas, escotado-adnatas, a veces un poco uncinadas, arista delgada, un poco erosionada o aserrada, blanquecina, de color azul violáceo a gris azulado. *Estípite* hasta 100 × 12 mm, más o menos claviforme, curvado, lleno, seco, fibrilloso, de color blanco, a menudo violáceo, a menudo adornado de bandas atigradas, transversales de color amarillo dorado; cortina viscosa, poco abundante y fugaz, viscosa. *Contexto* espeso, firme, crema, amarillo dorado en el *píleo*, con olor rabanoide y sabor amarescente.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,3) 8,3 ± 0,69 (9,5) × 6,5 (7,0) ± 0,35 (7,5) µm / Q = 1,1-1,4, redondeadas a elipsoidales, apiculadas, con verrugas pequeñas y libres, amarillo leonado claro en agua. Esporada marrón ferruginoso. *Pileipellis* filamentosa, gelificada, con hifas de hasta 5 µm, cilíndricas, septadas, fibuladas, con pigmento amarillo.

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y de coníferas, en suelos calcáreos y ácidos. Distribución. Poco común. R. Material estudiado. CANTABRIA, Valdáliga, 50m, con *Castanea sativa*, en suelo ácido, 16-IX-2023, *leg.* & *det.* JA Muñoz. BAR2023091614. Ibidem, 21-VIII-2026, *leg.* & *det.* J.A. Muñoz, BAR2026082101. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius delibutus Fr., BAR2023091614, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 µm.

