




Lactarius blennius (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici*: 337. 1838

≡ *Agaricus blennius* Fr., *Observationes Mycologicae* 1: 60. 1815 [basónimo]

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* de tamaño pequeño o medio. *Píleo* de 20-90 mm de diámetro, primero plano-convexo, después extendido y deprimido en el centro; margen primero incurvado y ondulado; superficie pileica lisa, brillante y viscosa en tiempo húmedo, mate en seco, separable y algo elástica, granulosa, con pequeñas fositas concéntricas hacia la periferia, de color pardo, pardo-grisáceo, con tonalidades oliváceas, verde claro en algunos casos. *Láminas* apretadas, desiguales, estrechas, de adnatas a decurrentes, con numerosas lamélulas, blanquecinas, gris-verdoso en las heridas; arista entera y concolor. *Estípite* de 30-60 × 8-20 mm, cilíndrico frágil, pronto hueco, liso o algo rugoso, del color del píleo, pero algo más claro. *Contexto* frágil y quebradizo, blanco, verdoso bajo la superficie pileica; olor débil, sabor acre; látex abundante, blanco, en las láminas toma un color gris-verdoso en algunos minutos.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (5,5-) 6,7 ± 0,52 (-8,0) × (5,0-) 5,7 ± 0,38 (-6,5) µm / Q = 1,2 ± 0,10 (-1,40); de subglobosas a anchamente elípticas, con ornamentación de crestas hasta ×1,0 µm de proyección, de redondeadas a agudas, cebradas, placa suprahilar débilmente amiloide. Esporada crema blanquecina. *Basidios* de 25-50 × 7-11 µm, tetraspóricos, claviformes. *Cheilomacrocidios* de 25-60 × 5-10 µm, abundantes, lageniformes o lanceolados, con el ápice agudo o mucronado. *Pileipellis* de tipo ixotricodermis, de hasta 60 µm de espesor, con hifas entremezcladas, de hasta ×4 µm.

Ecología. En verano y otoño, sobre todo bajo *Fagus sylvatica*, Distribución. Frecuente, E. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 750 m, con *Picea abies* y *Fagus sylvatica*, 16-X-2016, leg. & det. JA Muñoz & JA Cadiñanos, BAR2016102134. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Lactarius blennius (Fr.) Fr., BAR2016102134, a. Basidiosporas, b. Cheilomacrocidios. Escala barra: a = 5µm, b= 20 µm.

